

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Let op bij gebruik van natriumoxybaat. Natriumoxybaat is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan een merknaam hebben die anders is dan de werkzame stof. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN NATRIUMOXYBAAT VOOR PATIËNTEN

Let op: de bereidingswijze van de in te nemen dosissen natriumoxybaat verschilt per fabrikant. Controleer of u de juiste instructie voor bereiding van uw medicijn gebruikt. Neem contact op met uw arts of apotheker als u niet zeker weet hoe u dit middel moet gebruiken. Het is belangrijk dat u alleen de spuit gebruikt die in de verpakking wordt geleverd bij het bereiden van dosissen natriumoxybaat.

Instructies voor het verdunnen van natriumoxybaat


De volgende instructies leggen uit hoe natriumoxybaat moet worden bereid. Lees de instructies a.u.b. aandachtig door en volg deze stap voor stap. De natriumoxybaat verpakking bevat één fles natriumoxybaat drank, een doseerspuit met maatverdeling, een indruk-fles-adapter, twee doseerbekertjes met kindveilige doppen om uw twee nachtdosissen in te bereiden en bewaren, en de bijsluiter voor natriumoxybaat.

Lees de bijsluiter door voordat u de eerste twee dosissen natriumoxybaat inneemt, zodat u ook op de hoogte bent van andere belangrijke informatie. Gebruik natriumoxybaat altijd precies zoals uw arts heeft gezegd. Als u nog andere vragen hebt over natriumoxybaat, neem dan gerust contact op met uw arts.

U moet beide dosissen voor uw bedtijd bereiden.


Neem natriumoxybaat 2 of 3 uur na het avondeten, en niet eerder. Laat elke dag evenveel tijd tussen het avondeten en de eerste inname van natriumoxybaat.

1. Verwijder de dop van de fles door deze tegelijkertijd in te drukken en linksom te draaien (tegen de klok in). Na het verwijderen van de dop zet u de fles rechtop op een tafelblad. Boven op de fles zit een met plastic bedekt afdeklaagje, dat u moet verwijderen voordat u de fles voor het eerst gebruikt. Houd de fles rechtop en steek de indruk-flesadapter in de hals van de fles. Dit hoeft u alleen te doen als u de fles voor het eerst opent. Daarna kan de adapter voor verder gebruik in de fles blijven zitten.



Afbeelding 1

2. Plaats vervolgens de punt van de doseerspuit in de opening middenin de flessenhals en druk deze stevig omlaag (zie afbeelding 1).



Afbeelding 2

3. Houd de fles en spuit vast met één hand en zuig met de andere hand de voorgeschreven dosis (volgens de maatverdeling van 0,25 g op de cilinder van de spuit) op door aan de plunjer te trekken. **OPMERKING:** Er stroomt alleen geneesmiddel in de spuit als u de fles ondersteboven houdt (zie afbeelding 2).

4. Zet de fles rechtop. Verwijder de spuit uit de opening midden in de flessenhals. Spuit het middel in een van de meegeleverde doseerbekertjes door op de plunjer te drukken (zie afbeelding 3). Herhaal deze stap voor het tweede doseerbekertje. Voeg daarna ongeveer 60 ml water aan ieder doseerbekertje toe (60 ml is ongeveer 4 eetlepels).



Afbeelding 3

5. Plaats de meegeleverde doppen op de doseerbekertjes aan en draai elke dop rechtsom (met de klok mee) totdat deze vastklikt in de kindveilige stand (zie afbeelding 4). Spoel de spuit uit met water.



Afbeelding 4

6. Vlak voordat u gaat slapen, zet u de tweede dosis in de buurt van uw bed. Mogelijk moet u een wekker te zetten zodat u wakker wordt voor het innemen van uw tweede dosis. Deze moet u minimaal 2,5 uur en maximaal 4 uur na de eerste dosis innemen. Verwijder de dop van het eerste doseerbekertje door op het kindveilige vergrendelingslipje te drukken en tegelijkertijd de dop linksom te draaien (tegen de klok in). Drink zittend in bed de volledige eerste dosis op, doe de dop weer op het bekertje en ga meteen liggen.
7. Wanneer u 2,5 tot 4 uur later wakker wordt, verwijdert u de dop van het tweede doseerbekertje. Drink zittend op bed de tweede dosis helemaal op voordat u gaat liggen om verder te slapen. Doe de dop terug op het tweede bekertje.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op <https://www.aristo-pharma.de/de/nl/risicominimalisatiemateriaal>. Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker. Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).