

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Natriumoxybaat kan de ademhaling onderdrukken en het bewustzijn verlagen.

DOEN:

- Zoek direct medische hulp na een te hoge inname van natriumoxybaat
- Draag deze kaart altijd bij u
- Laat de kaart zien aan elke arts of apotheker die bij uw behandeling betrokken is
- Neem bij een bezoek aan uw arts of apotheker een lijst mee van alle medicatie die u gebruikt
- Als u ongewone symptomen ervaart tijdens het gebruik van natriumoxybaat, zoals gewelddadige gedachten waaronder gedachten om anderen pijn te doen, informeer dan onmiddellijk uw arts
- Bewaar natriumoxybaat buiten bereik van kinderen
- Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn
Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker

NIET DOEN:

- Gebruik **GEEN** alcohol terwijl u wordt behandeld met natriumoxybaat
- Gebruik **NIET** meer dan de dosis die uw arts heeft voorgeschreven
- U mag **NIET** autorijden of machines bedienen binnen 6 uur nadat u natriumoxybaat hebt gebruikt
- Gebruik **GEEN** andere medicijnen, tenzij u dit met uw arts hebt besproken
- U mag natriumoxybaat **NIET** met anderen delen

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Produkt	Natriumoxybat
Artikel-Nr.	50015394/1
Druck-Nr.	PC1008000-02/ NL/1022
Laetus-Code	
Packung	Patientenpass
Land	Niederlande
Größe	180 x 113 mm (gefalzt auf 90 x 113 mm)
Farben	Pantone 654 C
Datum	10.10.2022
Schriftgröße	8,5 pt
Änd.-Grund	Neuerstellung von Zulassungsdatei
Bearbeiter	Sibylle Kröpelin
Druck	laboserve

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR ARTSEN EN HULPVERLENERS

Deze patiënt gebruikt natriumoxybaat als behandeling voor narcolepsie met kataplexie.

Natriumoxybaat kan ademhalings- en CZS depressie, epileptische aanvallen, psychotische gebeurtenissen, depressie en suïcidaliteit veroorzaken.

Alcohol mag niet gebruikt worden tijdens de behandeling met natriumoxybaat.

Opioiden en barbituraten mogen niet gelijktijdig met natriumoxybaat worden gebruikt. Het gebruik van andere ademhalings- en CZS- onderdrukkende middelen moet worden vermeden. Wees extra voorzichtig met het gebruik van topiramaat en valproaat gelijktijdig met natriumoxybaat.

Natriumoxybaat kan misbruik/oneigenlijk gebruik/afhankelijkheid veroorzaken.

Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken van natriumoxybaat voordat u deze patiënt andere geneesmiddelen voorschrijft of verstrekt.

Aanvullende informatie betreffende natriumoxybaat is beschikbaar in de samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Deze kaart is online beschikbaar op <https://www.aristopharma.de/de/nl/risicominimalisatiemateriaal>.

Datum waarop natriumoxybaat voor het eerst is voorgeschreven:

..... / /

CONTACT INFORMATIE

Naam en telefoonnummer van patiënt

.....

Naam en telefoonnummer van naast familielid

.....

Naam en telefoonnummer van behandelend arts

.....

Telefoonnummer bij medische nood

.....